

FRONT PANEL PATIENT CARD

ES

Tarjeta del
paciente para
TOPAMAX

ES-77949-0

Para mujeres
y niñas fértiles

Métodos anticonceptivos
y prevención del
embarazo

Lo que usted debe saber

- TOPAMAX es un medicamento para la epilepsia y las migrañas.
- TOPAMAX puede provocar daños graves a un bebé durante la gestación si se toma durante el embarazo.

Lo que usted debe hacer

- Lea el prospecto y la guía del paciente cuidadosamente antes de su uso.
- Use métodos anticonceptivos altamente eficaces durante su tratamiento con topiramato

y durante al menos 4 semanas después de la última dosis de topiramato. Su médico le aconsejará sobre el método más apropiado para usted.

- Visite a su médico para revisar su tratamiento al menos una vez por año.

- Si piensa que ha quedado embarazada, consulte a su médico inmediatamente.
- Si están pensando en tener un hijo, no interrumpa el uso de los métodos anticonceptivos antes de haber consultado a su médico.

- Si usted tiene epilepsia, no interrumpa el uso de topiramato a menos que su médico se lo indique, dado que su estado podría empeorar.

Pídale a su médico que le entregue la guía del paciente o escanee este código QR para obtenerla.



URL: <https://cima.oemps.es/cima/DocsPub/16/3252>
Guarde esta tarjeta.

BACK PANEL PATIENT CARD

ES

Tarjeta del
paciente para
TOPAMAX

ES-77949-0

Para mujeres
y niñas fértiles

Métodos anticonceptivos
y prevención del
embarazo

Lo que usted debe saber

- TOPAMAX es un medicamento para la epilepsia y las migrañas.
- TOPAMAX puede provocar daños graves a un bebé durante la gestación si se toma durante el embarazo.

Lo que usted debe hacer

- Lea el prospecto y la guía del paciente cuidadosamente antes de su uso.
- Use métodos anticonceptivos altamente eficaces durante su tratamiento con topiramato

y durante al menos 4 semanas después de la última dosis de topiramato. Su médico le aconsejará sobre el método más apropiado para usted.

- Visite a su médico para revisar su tratamiento al menos una vez por año.

- Si piensa que ha quedado embarazada, consulte a su médico inmediatamente.
- Si están pensando en tener un hijo, no interrumpa el uso de los métodos anticonceptivos antes de haber consultado a su médico.

- Si usted tiene epilepsia, no interrumpa el uso de topiramato a menos que su médico se lo indique, dado que su estado podría empeorar.

Pídale a su médico que le entregue la guía del paciente o escanee este código QR para obtenerla.



URL: <https://cima.oemps.es/cima/DocsPub/16/3252>
Guarde esta tarjeta.

77949.pdf - Page 3 of 4 - July 18, 2024 - 10:51:40